

Megestrol 美雅祥錠

- 一、作用機轉：為合成黃體素製劑，具有抗雌激素活性，而直接對腫瘤細胞產生傷害。也會影響腦下垂體，產生抗黃體化作用。
- 二、注意事項及常見或嚴重副作用：
 - (一) 心臟血管方面副作用：高血壓($\leq 8\%$)、心肌病變(1-3%)、胸痛(1-3%)、水腫(1-3%)、心悸(1-3%)、末梢水腫(1-3%)、心臟衰竭。
 - (二) 皮膚方面副作用：皮疹(2-12%)、掉髮(1-3%)、皮膚搔癢(1-3%)、水泡性皮疹(1-3%)。
 - (三) 胃腸方面副作用：腹瀉(6-15%)、脹氣($\leq 10\%$)、嘔吐($\leq 6\%$)、噁心($\leq 5\%$)、消化不良($\leq 4\%$)、腹痛(1-3%)、便秘(1-3%)、唾液分泌增加(1-3%)、口乾(1-3%)、體重增加(水腫或體液滯留)。
 - (四) 代謝及內分泌方面副作用：高血糖($\leq 6\%$)、發生率不明之副作用：腎上腺皮質功能不全、閉經、乳房脹痛增加、皮質醇增多症、糖尿病、熱潮紅、月經量的變化。
 - (五) 血液方面副作用：貧血($\leq 5\%$)、白血球減少(1-3%)。
 - (六) 肝臟方面副作用：肝腫大(1-3%)、乳酸脫氫酶升高(1-3%)、膽汁淤積性黃疸。
 - (七) 肌肉骨骼方面副作用：虛弱(2-6%)、神經病變(1-3%)、感覺異常(1-3%)、腕隧道症候群。
 - (八) 神經系統副作用：頭痛($\leq 10\%$)、失眠($\leq 6\%$)、發燒(1-6%)、意識混亂(1-3%)、憂鬱(1-3%)、情緒變化、全身乏力、嗜睡。
 - (九) 眼睛方面副作用：弱視(1-3%)。
 - (十) 腎臟方面副作用：蛋白尿(1-3%)。
 - (十一) 生殖系統副作用：性慾減退($\leq 5\%$)、尿失禁(1-3%)、尿道感染(1-3%)、頻尿($\leq 2\%$)。
 - (十二) 呼吸系統方面副作用：呼吸困難(1-3%)、咳嗽(1-3%)、咽炎(1-3%)、肺炎($\leq 2\%$)。
 - (十三) 其它方面副作用：出汗(1-3%)、疱疹病毒感染(1-3%)、念珠菌感染(1-3%)、暫時性腫瘤加劇。

註釋： 抗癌藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準), 用於描述病人接受化療後, 所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類, 分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重 (3 級), 或致命 (4 級)、死亡 (5 級)。當你發生 3 級以上的副作用時, 應盡速就醫。