

# 抗B肝病毒

## Entecavir (貝樂克) 錠劑

### Entecavir (貝樂克) 錠劑

主成份	商品名	中文商品名	含量
Entecavir	Baraclude Tab	貝樂克膜衣錠	1 毫克/錠

#### 作用：

治療 B 型肝炎。移植後身體的免疫系統尚未恢復與同時需要長期使用免疫抑制劑，身體內的 B 型肝炎病毒可能被活化。貝樂克可以抑制病毒的活化，將自移植前一週起至免疫抑制藥物停用後 6 個月。

#### 用法：

劑量用法依個人及病情而異，請務必遵照醫囑服藥。空腹服用（飯前或飯後 2 小時）。食物會延遲吸收並使 AUC 降低 18% 至 20%。

#### 注意事項：

1. 使用本藥並不會降低經由性行為或血液傳染 B 型肝炎病毒給其他人的機會。
2. 有肝病危險因素的病人慎用（女性、失代償性肝病、肥胖或過去長期使用抗病毒藥物可能會增加風險），發生乳酸性酸中毒或肝指數升高需要暫停本藥治療。
3. 停止抗 B 型肝炎治療，可能會導致 B 型肝炎再度發生急性發炎。停止治療後接續幾個月都需要監測肝功能；可能需要重再重新開始 B 型肝炎治療。請勿隨意停藥。
4. 使用本藥前及使用期間，應確定沒有人類免疫缺乏症病毒（HIV）感染。本藥可能導致慢性 B 型肝炎病人在未識別或未治療的 HIV 感染中產生 HIV 的抗藥性。除非同時接受抗逆轉錄病毒治療，否則不建議用於 HIV/HBV 合併感染病人只單獨治療慢性 B 型肝炎。

#### 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用，若想起時離下一次服藥時間短於 12 小時，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
肝臟：血清轉氨酶升高、血尿、血清膽紅素升高、腎臟血清肌酐升高。	醫師會進行抽血檢驗。
皮疹、疲勞、頭痛。	觀察。告知醫師。