



# Panitumumab (Vectibix®)

## 維必施注射劑® 100 毫克/支

100 mg/5 mL/vial

民眾閱讀版 | 傅彥歲藥師撰

### 作用機轉

標靶藥物。腫瘤細胞表面常有表皮生長因子受體的過度表現，這就像一種特別的印記(抗原)。

Ponitumumab 這種單株抗體設計成標記該抗原，意即選擇性結合到表皮生長因子受體上，進而抑制表皮生長因子所調控的細胞生長，及誘導細胞凋亡。

### 致吐性與血液方面副作用

- 致吐性：低度致吐(有 10-30% 的病人會發生嘔吐，3/4 級： $<1\%$ )
- 骨髓抑制程度：低度抑制。

### 適應症

#### ■ 轉移性大腸直腸癌

本資訊僅供參考，若有疑問，請諮詢癌症專業藥師或腫瘤科醫師。

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。

藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, 又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為：輕微(1級)、中級(2級)、嚴重(3級)、或致命(4級)、死亡(5級)。發生3級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4級大多需要住院介入醫處理。

## 注意事項及常見副作用

1. 皮膚系統：皮膚發紅(66%)、搔癢(58%)、痤瘡性皮疹(57%)、甲溝炎(25%)、紅疹(22%)、皮膚乾裂(20%)、剝落性皮膚炎(18%)、青春痘(14%)、乾皮症(10%)、脫屑(9%)、皮膚潰瘍(6%)。
2. 胃腸系統：噁心(23%, 3/4級： $<1\%$ )、腹瀉(21%, 3/4級：2%)、嘔吐(19%, 3/4級：3%)、黏膜腫脹(7%)、口腔黏膜炎(7%)、口乾(5%)。
3. 代謝系統：低血鎂(3/4級：7%)、脫水(3%)、低血鉀(發生率未知)。
4. 免疫系統：輸注相關反應(3%-4%，3/4級： $\leq 1\%$ )。
5. 神經系統：發冷顫(3%)。
6. 眼睛：睫毛生長異常(6%)、結膜炎(5%)、角膜炎(發生率未知)
7. 呼吸系統：流鼻血(4%)、間質性肺炎(1%)、肺纖維化( $<1\%$ )。
8. 心臟血管系統：肺栓塞(1%)。
9. 其他：發燒(17%)。

## 藥師小叮嚀

1. 防曬。為避免陽光直射皮膚，外出時請做好防曬措施。至少須於治療期間、及最後一劑維必施結束後兩個月內做好防曬。
2. 保濕。每天至少兩次使用不含酒精的濃稠保濕/潤膚霜滋潤皮膚。
3. 痤瘡性皮疹的副作用自我照護，請參照副作用症狀解釋與自我照護中的<<痤瘡性皮疹>>章節。
4. 若您於服藥期間有以下症狀出現，請於立即聯絡您的醫師或前往急診：
  - 胸痛、胸悶、呼吸喘、吞嚥困難、聲音無預警沙啞。
  - 發燒、發冷顫。
5. 副作用等級 3/4 級即表示該副作用需要回診或入院接受治療。
6. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物之間交互作用。
7. 此藥可能會影響生育能力及胎兒發育，病人於服藥期間應採有效避孕措施。
8. 因此藥在乳汁的分布情形尚未被研究，治療期間與最後一劑維必施結束後 2 個月內的婦女時不建議哺乳。
9. 臨床監測項目：血中鈣離子、鎂離子、鉀離子、皮膚症狀、眼部症狀及腸胃道症狀。