



## Afatinib (Giotrif®)

### 妥復克膜衣錠

30,40 mg / vial | 民眾閱讀版 | 方麗華藥師撰

#### 作用機轉


標靶藥物。Afatinib 是一種高度選擇性的酪氨酸激酶抑制劑。Afatinib 在表達野生型 EGFR 和選定的 EGFR 外顯子 19 缺失突變、外顯子 21 L858R 突變或其他不太常見的非抗藥性突變的細胞，可抑制自身磷酸化和/或增殖。會與表皮生長因子受體結合，進而抑制腫瘤生長。

#### 致吐性及骨髓方面副作用

1. 致致吐性：低致吐風險 (<30% 的病人會發生嘔吐 )
2. 抑制血球生長程度：白血球降低(12%, 3/4 級:%)、淋巴球降低(38%, 3/4 級:9%)

#### 注意事項及常見副作用

1. 皮膚系統：痤瘡(90% ; 3 級 16%)、甲溝炎 ( 11-58% ; 3 級 11% )、皮膚乾燥(31%)、皮膚搔癢 (21%)、唇炎 ( 12% )、手足症候群 ( 2-7% )。皮膚方面的副作用，醫師會視情況給予治療，大多可達到良好的控制。
2. 代謝及內分泌系統：體重減輕(17%)、低血鉀



註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE，又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微(1級)、中級(2級)、嚴重(3級)或致命(4級)、死亡(5級)。發生3級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4級大多需要住院介入醫療處理。

- ( 11% ) 。
3. 胃腸系統：腹瀉(75-96%；3級 15%)為常見的副作用，多發生於給藥的前 6 個星期、口腔炎 ( 30-71% ；3 級 9% ) 、喪失食慾(25-29%)、嘔吐 ( 13-23% )
  4. 泌尿生殖系統：膀胱炎 ( 13% )
  5. 肝臟方面副作用：肝功能指數升高。GPT(10-54%)、ALP (34-51%)、GOT/AST(7-46%)、膽紅素停藥後可恢復，可能需降低劑量。
  6. 腎臟系統：腎功能指數升高 ( 6% )
  7. 眼睛系統：結膜炎(11%)、角膜炎(<1%)。
  8. 精神系統：疲倦(<2%)。
  9. 呼吸系統：鼻出血(17%)、流鼻涕(11%)、肺炎 (> 1%，亞洲人：2%) 、間質性肺炎(1%)
  10. 其它：發燒 ( 12% )

## 藥師小叮嚀

1. 一天一次，固定時間服用請固定時間空腹服用(飯前一小時或飯後兩小時；若錯過服藥時間 12 小時以上，直接在下次服藥時間吃藥即可，不需補吃遺漏的劑量。)
2. 無法吞服之病人，可將錠劑放入約 100 c.c. 飲用水(不可置於碳酸飲料 或其它液體)，攪拌直到崩散成小顆粒後(約 15 分鐘)立即飲用。再以 100 c.c. 水潤洗杯子後飲下。
3. 食物交互作用：高脂食物會降低藥物的吸收。
4. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物之間交互

作用。

5. 痤瘡型皮疹的副作用自我照護請參照副作用症狀解釋與自我照護中《痤瘡型皮疹》的章節。
6. 腹瀉時請按照醫師指示服用止瀉藥如 loperamide 直到止瀉滿 12 小時。請參照副作用症狀解釋與自我照護中《腹瀉》的章節。
7. 婦女使用此藥時不可以哺乳，須等待至停藥 2 周後才可進行哺乳。
8. 此藥可能會影響生育能力及胎兒發育，病人於服藥期間至停藥後 2 周) 應採有效避孕措施並避免哺乳。
9. 使用此藥可能會增加感染風險，盡量避免出入公共場所或接觸有感染的病人。
10. 注意是否有眼睛不適、如視力模糊、痛、流淚不止、光敏感，請告知醫師。
11. 間質性肺炎的症狀為持續咳嗽、呼吸困難及發燒，如有發生此情形請盡速就醫。
12. 副作用等級 3/4 級即表示該副作用需要回診或入院接受治療。
13. 臨床監測項目: EGFR 突變狀態、肝功能指數、皮膚毒性、腹瀉狀況、是定期監測心電圖和電解質。