

Palbociclib (Ibrance®)愛乳適膠囊

125 mg/cap | 民眾閱讀版 | 方麗華藥師撰



作用機轉

Palbociclib 為一種蛋白磷酸激酶抑制劑 (kinase inhibitor)，能選擇性抑制 CDK4/6 這種蛋白磷酸激酶。在某些癌細胞中 CDK4/6 會被過度活化，擾亂細胞週期而導致癌細胞不斷複製增生，若用 Palbociclib 阻止 CDK4/6 則可以抑制癌細胞增生。

致吐性及骨髓方面副作用

- 低致吐性 (即若未給止吐藥預防，有10-30%的病人會發生嘔吐)。
- 抑制血球生長程度：血球低下 (43-53%，第 3/4 級 19-30%可能需醫療介入)、嗜中性球低下 (75-83%，第 3 級 48-55%、第 4 級 6-11%可能需醫療介入)、貧血 (30-35%，第 3/4 級 5%可能需輸血)、血小板低下 (17-23%，第 3/4 級 2%可能需輸血小板)。

注意事項及常見副作用

- 胃腸道副作用：噁心 (25-34%)、胃炎 (25-28%)、腹瀉 (21-24%)、便秘 (20%)、嘔吐

常見適應症

晚期或轉移性乳癌




(15-19%)、食慾減低 (16%)

- 神經系統副作用：頭痛 (26%)、周邊神經炎 (13%)、無力 (8-13%)
- 皮膚方面副作用：掉髮 (18-22%)、紅疹 (17%)
- 免疫系統副作用：感染 (47-55%)
- 呼吸系統副作用：上呼吸道感染 (31%)、鼻血 (7-11%)
- 其他副作用：虛弱 (41%)、發燒 (13%)

註釋：癌症藥物進行臨床試驗時，所收載的副作用，會包括藥物本身的副作用、原本疾病表現的症狀、或當下併用的其他藥物的可能副作用。藥物副作用的定義是由美國癌症研究院制訂的 Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE，又稱常見毒性標準)，用於描述病人接受化療後，所發生器官毒性的嚴重度分級。毒性分級由器官系統的特別分類，分為輕微 (1 級)、中級 (2 級)、嚴重 (3 級) 或致命 (4 級)、死亡 (5 級)。發生 3 級以上的副作用時，需醫療介入處理且進行劑量調整或停藥。4 級大多需要住院介入醫療處理。

藥師小叮嚀

1. 本藥品需與食物併服，亦可和牛奶併服。避免與葡萄柚並用，會增加血中濃度而增加臨床毒性。t
2. 此藥品膠囊需整粒吞服，請不要將膠囊剝開、磨粉、咀嚼。
3. 請將此藥儲存於室溫陰涼乾燥處 (20-25 °C)。
4. 若忘記服藥或服藥後嘔吐，就直接待下次服藥時間再服用下一次的藥量即可。(千萬不要一次吃雙倍藥量！)
5. 如有使用其他藥物，請藥師檢查是否有藥物交互作用。
6. 若您服藥期間發現有以下的症狀出現，請立即與您的醫師聯繫：
 - 感染徵象：發燒、畏寒、咳嗽、鼻水/鼻涕、喉嚨痛、各種疼痛
 - 肺部血栓：喘、胸痛、呼吸困難、咳血
 - 過敏：蕁麻疹、臉或手發生紅或腫、喉嚨或嘴巴紅腫刺痛、胸口緊、呼吸困難
 - 心悸、呼吸急促、暈眩、畏光頭痛、異常出血、瘀青、虛弱、四肢無力

- 
7. 若您服藥期間發現有以下的症狀出現，請於下次回診時告知醫師：
 - 頭痛、噁心、疲倦
 - 嘴唇、口腔或喉嚨有紅腫或白斑
 8. 本藥品有可能對胎兒造成傷害，因此並不適用於懷孕婦女，女性病人於服藥期間至停藥後至少3週內皆應採有效避孕措施並避免哺乳；男性病人於服藥期間至停藥後至少3個月內皆應採有效避孕措施。
 9. 副作用等級3/4級即表示該副作用需要處理(調整藥物劑量與臨床處理)或住院接受治療。
 10. 臨床監測: 全套血球計數。