

## 口服抗黴菌藥品

主成份	商品名	中文商品名	含量
Fluconazole	Diflucan Capsule	泰復肯膠囊	50 毫克/膠囊
Voriconazole	VFEND Tablet	黴飛膜衣錠	200 毫克/錠
Posaconazole	Posanol Tablet	波塞特錠	100 毫克/錠
Isavuconazole	Cresemba Cap	驅黴霸膠囊	100mg 毫克/膠囊

### 作用：

本類藥屬於抗黴菌藥，使用於黴菌引起的感染或預防，黴飛膜衣錠與波塞特錠都需要進行血中濃度監測。但此類藥物會影響免疫抑制藥物環孢靈的血中濃度，因此需要監測環孢靈的血中濃度，進行劑量調整。

### 用法：

1. 用法及劑量遵照醫師處方使用。當藥物血中濃度平穩才能發揮最大的作用，所以最好依給藥次數將每次的服藥時間平均分佈於一日中。有任何問題請教藥師或醫師。
2. 泰復肯膠囊 (Diflucan Capsule)、波塞特錠(Posanol Tablet)、可以服用空腹或與食物一起。黴飛錠 (VFEND Tablet) 需飯前或飯後 1 小時服用。

### 注意事項：

1. 服用藥前有下列事項請告知醫師：懷孕或哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（如

肝、腎疾病、心律不整、胃酸分泌不足）或同時服用它種藥物（如抗過敏藥、胃藥、抗凝血藥等）。讓醫師決定是否應用藥。如果曾經或現在有肝臟疾病，應定期監測肝功能指數。

2. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。否則可能會復發。
3. 泰復肯膠囊 (Diflucan Capsule)：會降低避孕藥的效果，所以須有其他的避孕方法。
4. 黴飛錠 (VFEND Tablet)：在動物實驗有致畸型胎報告，服藥期間勿懷孕。用藥期間勿飲葡萄柚汁。服藥期間避免需要依賴視力而有危險性的工作，如開車或操作重機械工作。服藥期間，對光也會較敏感，外出可穿長袖或擦防曬劑。視覺障

礙：可能由於對棒狀和錐狀細胞通路的影響，包括視力模糊、視神經炎、視力顏色改變、鞏膜外層炎和鞏膜炎。視覺障礙可能會在停藥後 24 小時至 2 週內消失。幻覺：可能由於較高的血中濃度，停藥後可恢復。骨膜炎，表現為血清鹼性磷酸酶升高、氟骨症以及常規 X 光片和核掃描顯示骨膜炎，停藥後可逆。疼痛通常在停藥後 2 周至 4 個月內改善。需要抽血監測血中濃度。

5. 波塞特錠 (Posanol Tablet)：整片吞服；

不要壓碎或咀嚼。與食物同服。如果錯過劑量，記得盡快服用。肝功能需要常規監測（皮膚或眼睛發黃、尿色深、嚴重噁心、嘔吐、腹痛）。此外服用此藥可能容易造成低血鉀的情形，故應定期監測血鉀，以免影響心律。亦需要進行血中濃度監測。

6. 驅黴霸膠囊(Cresemba Cap)：可空腹或與食物一起服用。建議吞下整個膠囊；不要咀嚼、壓碎、溶解或打開。副作用：可能導致電解質失衡，例如低鉀血症，可能導致肌肉無力、痙攣或心律不整。周邊水腫：可能會因體液滯留而出現四肢腫脹。

### 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。但如果想起時剛好是下一次的服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。絕不可一次服用二次的劑量。

### 此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
發疹、搔癢或因肝異常引起之症狀（如異常疲勞、噁心、嘔吐、黃疸〈皮膚或眼睛變黃〉、尿液顏色加深、糞便變白）、呼吸困難	請停藥，並立即就醫。
便秘、下痢、頭痛、眩暈、頭痛	若症狀持續或嚴重，請告知醫師。
黴飛錠 (VFEND Tablet)：發生視覺改變(畏光、顏色辨識改變、視力模糊)，並告知醫師。	